

Μίγμα Ιχνοστοιχείων σε υδατοδιαλυτή σκόνη

Combi-Mix

Λίπασμα Ε.Κ.



Περίεργα

Σίδηρο	4,1% (EDTA)
Ψευδάργυρο	1,4% (EDTA)
Μαγνήσιο	4,6% (Άλας)
Μαγγάνιο	3,8% (EDTA)
Βόριο	0,7% (Άλας)
Χαλκό	1,3% (EDTA)
Μολυβδαίνιο	0,08% (Άλας)
Θείο	4,4% (Άλας)

ΤΡΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφυλλική εφαρμογή: Η διαφυλλική εφαρμογή συστήνεται για γρήγορη

διόρθωση τροφωτικών. Για να επιτύχετε μέγιστα οφέλη, οι διαφυλλικές εφαρμογές πρέπει να ξεκινούν στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου, μόλις υπάρξει ικανοποιητική φυλλωσιά για να απορροφήσει το στρέ. Σε περίπτωση έντονων τροφωτικών οι εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 7-14 ημέρες. Όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά μόνο του, συστήνεται η πρόσθεση στο διάλυμα προσκολλητικού.

Εδαφική εφαρμογή: Διαλύστε σε κατάλληλη ποσότητα νερού, και εφαρμόστε με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης ή μέσα αυστημάτος άρδευσης σταγόνιας μαζί με κάποιο υγρό λίπασμα. Εφαρμόστε στο έδαφος κοντά στα φυτά και στους κορμούς των δέντρων. Για αύξηση της λήψης των θρεπτικών στοιχείων αλατίστε και ποτίστε προσεχτικά μετά από κάθε εφαρμογή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ: Οι δοσολογίες εξαρτώνται από το είδος και το μέγεθος του φυτού, τον τύπο του εδάφους καθώς και το βαθμό της τροφωτικής.

Διαφυλλική εφαρμογή

Λαχανικά υπαίθριος καλλιέργειες : 50 - 100 γρ./στρέμμα. Δημητριακά : 100 - 200 γρ./στρέμμα. Αμπέλια : 100 - 150 γρ./στρέμμα. Οπωροφόρα δέντρα (μήλα, αχλάδια κτλ.) : 100 - 250 γρ./στρέμμα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε μήλα ποικιλίας Golden. Θάμνοι (φρούλες, βατόμουρα κτλ.) : 100 - 150 γρ./στρέμμα. **Λαχανικά θερμοκηπίου** (τουμάς, αγκούρια, πιπεριές κτλ.) : 50-100 γρ./στρέμμα. Καλλωπιστικά : 50-100 γρ./στρέμμα.

Σημείωση : Οι δοσολογίες δεν πρέπει να ξεπερνούν ποτέ το 1 γρ./λίτρο νερό. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στάδιο πλήρους ανθοφορίας.

Εδαφική εφαρμογή

Λαχανικά : 0,4 - 0,8 κιλά/στρέμμα. **Δημητριακά :** 0,4 - 1 κιλό/στρέμμα. **Οπωροφόρα δέντρα & θάμνοι :** 0,4 - 1 κιλό/στρέμμα. Καλλωπιστικά : 0,2 - 1 κιλό/στρέμμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες όπως υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μπορεί να αναμιχθεί με τα περισσότερα λιπάσματα και αγροχημικά προϊόντα χωρίς να δημιουργείται ίζημα ή πρόβλημα εγκαυμάτων. Όταν συνδυάζεται με υγρό λίπασμα το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συντομότερο δυνατό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του σε ξηρό μέρος, μακριά από έντονο φως. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ET.001.047 - Ver. 19.1 GR1219

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας : H360FD:

Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Δηλώσεις Προφύλαξης : P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P281:

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:

Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

Περίεργα: Disodium Octaborate Tetrahydrate

Μόνο για επαγγελματική χρήση