

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα

Food 4 Plants

Για δυνατό
ρίζικό σύστημα &
επιτυχή μεταφύτευση

npk 7-12-6
με 41% οργανική ουσία



Παράγεται από την

HUMOFERT



www.humofert.gr

Καθ. βάρος: 1 kg

για δυνατό ριζικό
σύστημα & επιτυχή
μεταφύτευση

Οργανοχημικό Κοκκώδες Λίπασμα

Food 4 Plants

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Άζωτο	7,7 %
Αμμωνιακό	5,5 %
Οργανικό	2,2 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	12,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	5,7 %
Ασβέστιο (CaO)	10,5 %
Μαγνήσιο (MgO)	1,6 %
Θείο (S)	3,5 %
Οργανικός Άνθρακας	21,0 %
Οργανική ουσία	41,0 %
Αμινοξέα-Πρωτεΐνες	15,0 %
Χουμικά οξέα	8,0 %
Υγρασία	7,0 %
C/N	2,7

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Περιέχει θρεπτικά στοιχεία σταδιακής αποδέσμευσης
- Αφομοιώνεται πλήρως από τα φυτά
- Έχει ενισχυμένη δράση λόγω της ύπαρξης οργανικής ουσίας υψηλής ποιότητας
- Είναι εμπλουτισμένο με ελεύθερα αμινοξέα, πρωτεΐνες και χουμικά οξέα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μεταφύτευση-Προετοιμασία εδάφους: Διασκορπίζουμε στο έδαφος ή στο φυτόχωμα πριν τη φύτευση και αναμιγνύουμε καλά με σκάλισμα μέχρι το λίπασμα να ενσωματωθεί πλήρως με το χώμα.

Ενδυνάμωση Ρίζας: Διασκορπίζουμε στο έδαφος περιμετρικά των ριζών ή του κορμού και στη συνέχεια παραχώνουμε το λίπασμα με ελαφρύ σκάλισμα μέχρι να ενσωματωθεί καλά στο χώμα. Καλό είναι μετά την εφαρμογή να ακολουθήσει πότισμα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Κηπευτικά: 1-2 κιλά ανά 20 τ.μ.

Φράουλα: 0,5-1 κιλό ανά 20 τ.μ.

Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι: 100-300 γρ./φυτό 1-2 φορές το χρόνο

Ανθοκομικά φυτά: 50-100 γρ./φυτό 1-2 φορές το χρόνο

Οπωροφόρα, Ελιά, λοιπά δέντρα: 250-500 γρ./ δέντρο 1-2 φορές το χρόνο

Χλοοτάπητες: 100-150 γρ./τ.μ. πριν τη σπορά ή την τοποθέτηση του έτοιμου χλοοτάπητα (ενσωμάτωση με το χώμα). Επανάληψη μετά από 1-1,5 μήνα στην ίδια δοσολογία.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία, σε θερμοκρασία δωματίου, σε ξηρό μέρος χωρίς υγρασία, προστατευμένο από βροχή, πάγο και υψηλές θερμοκρασίες.

Μην απορρίπτετε τις άδειες συσκευασίες στο περιβάλλον.